

FICHA TÉCNICA ATAQUE

Número de Registro: PQA Nro. 743-SENASA

IDENTIDAD

Composición : Imidacloprid
Concentración : 350 g/L
Formulación : Suspensión concentrada (SC)
Grupo Químico : Neonicotinoides
Clase de Uso : Insecticida
Grupo IRAC : Grupo 4A. Agonistas del receptor nicotínico de la acetilcolina (Acción nerviosa)

CARACTERÍSTICAS

Es un insecticida que pertenece al grupo de los Neonicotinoides

MODO DE ACCIÓN

ATAQUE, es un insecticida que se mueve a través de toda la planta. Una vez en la planta **ATAQUE** actúa por contacto e ingestión en el insecto.

ATAQUE puede ser aplicado a través de un sistema de riego lo cual facilita su manejo

MECANISMO DE ACCIÓN

ATAQUE, funciona atacando el sistema nervioso del insecto lo que ocasiona la posterior muerte de este. **ATAQUE** trabaja principalmente sobre insectos picadores y chupadores.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicaciones al follaje

CULTIVO	PLAGA		Dosis		PC (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/ha		
TOMATE	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	-	0.3- 0.375	1	0.5
MANDARINA	Minador de la hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.1	0.41	30	1
PIMIENTO	Pulgón de la papa	<i>Myzus persicae</i>	0.15-0.2	-	21	1
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.2	-	7	1
PALTO	Querezas	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.15	-	7	1
ARÁNDANO	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	-	3	3.5

Aplicaciones al sistema de riego por goteo

CULTIVO	PLAGA		Dosis		PC (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/ha		
VID	Filoxera	<i>Viteus vitifoliae</i>	-	1.5	14	1

P.C: periodo de carencia; LMR: límite máximo de residuos

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplicar a los primeros indicios de la plaga en campo.

Para determinar la incidencia de la plaga, realizar monitoreos frecuentes en campo.

Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña/año con un intervalo de aplicación de 14 días.

COMPATIBILIDAD

ATAQUE, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

REINGRESO A UN ÁREA TRATADA

No reingrese a las áreas de aplicación hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD

ATAQUE, no es fito-tóxico a la dosis, sistema de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Moderadamente peligroso.