

FICHA TÉCNICA

FULL POTASIO

GENERALIDADES:

Producto: FULLPOTASIO

Clase de uso: Fertilizante Foliar

Distribuidor: PERU PRODUCTOS AGRICOLAS

COMPOSICIÓN:

Potasio (K₂O)..... 280 g/L

Materia Orgánica Total..... 225g/L

Extracto Húmico Total 220 g/L

Densidad..... 1.3 – 1.4 g/L

pH..... 5.5 + 1.0

CARACTERÍSTICAS:

FULLPOTASIO es un nutriente foliar, formulado como concentrado soluble con contenido óptimo de potasio, enriquecido con materia orgánica y extractos húmicos, especialmente diseñado para proporcionar este elemento en etapas de mayor requerimiento de los cultivos, incrementando la producción de almidones y azúcares que son translocados a los órganos de producción y de reserva.

FULLPOTASIO se aplica vía foliar, es indispensable en casos de suelos arenosos o livianos en los cuales el desplazamiento del potasio es sumamente rápido alejándolo de las raíces, así mismo suelos salinos que retienen este elemento en el complejo de cambio disminuyendo su disponibilidad para los cultivos.



inveragro
Perú Productos Agrícolas S.A.C.

COMPATIBILIDAD:

Con mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible con los productos para la protección vegetal sin embargo se recomienda realizar pruebas a nivel de campo.

RECOMENDACIONES:

☑ Recuerde que las plantas no deben de estar dañadas físicamente y que las condiciones de humedad del suelo deben de ser apropiadas.

☑ No aplicar en horas de fuerte insolación y con presencia de fuertes vientos es preferible aplicar en horas de la tarde.

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIONES Y MOMENTO DE LA APLICACIÓN
Papa	1 a 2 L	Aplicar al inicio de la floración y cada 15 días hacer tres aplicaciones como mínimo.
Cítricos	4 a 6 L	Aplicar al inicio de la floración , inicio del cuajo y en la etapa de crecimiento del fruto.
Tomate, aji y paprika	1 a 2 L	Aplicar al inicio de la floración y en fructificación. Hacer tres aplicaciones como mínimo
Cebolla	1 a 2 L	Aplicar desde los 45 días y repetir cada 15 días, en 3 a 4 oportunidades.
Lechuga, apio y col	1 a 2 L	Aplicar desde los 30 días después del trasplante y repetir cada 10 días por 4 veces.
Esparrago	2 a 3 L	Aplicar a partir del tercer brote y cada 15 días repetir la aplicación 3 a 4 veces.
vid	1 a 2 L	Aplicar desde que la uva tenga 3 mm de diámetro y cada 15 días en 3 a 4 oportunidades

