

FICHA TÉCNICA OLIMPO 5% SG

Número de Registro: PQUA N° 1330 - SENASA

IDENTIDAD

| | |
|---------------|---|
| Composición | : Emamectin Benzoato |
| Concentración | : 50 gr/kg |
| Formulación | : Gránulos solubles |
| Grupo Químico | : Avermectinas |
| Clase de Uso | : Insecticida Agrícola |
| Grupo IRAC | : Grupo 6: Moduladores alostéricos del canal de cloro regulado por glutamato (GluCl) (Acción nerviosa y muscular) |

CARACTERÍSTICAS

Es un insecticida perteneciente al grupo de las Avermectinas.

MODO DE ACCIÓN

OLIMPO 5% SG, afecta a los insectos plaga por contacto e ingestión lo que provoca la muerte por inanición de estos invertebrados. Controla una amplia gama de lepidópteros en diversos cultivos.

MECANISMO DE ACCIÓN

OLIMPO 5% SG, trabaja a nivel de las neuronas de los insectos, donde afecta los canales de cloro provocando una paralización del cuerpo del insecto, lo que causa que la plaga no pueda alimentarse por tanto evita el daño a los cultivos.

RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | PC (días) | L.M.R (ppm) |
|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|-----------|-------------|
| | Nombre Común | Nombre Técnico | Kg/ha | Kg/200L | | |
| Espárrago | Caballada (Gusano ejercito) | <i>Spodoptera eridania</i> | 0.2 | - | 7 | 0.01 |
| Palto | Perforador de los frutos | <i>Argyrotaenia spheropa</i> | - | 0.08 | 3 | 0.01 |
| Vid | Eumorpha | <i>Eumorpha vitis</i> | - | 0.1 | 7 | 0.05 |

P.C: periodo de carencia; LMR: límite máximo de residuos

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplicar a los primeros indicios de la plaga en campo.

Realizar como máximo una aplicación por campaña. Contar con equipos en buen estado para una buena aplicación de OLIMPO 5% SG.

COMPATIBILIDAD

OLIMPO 5% SG, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina. Si existiera duda de la compatibilidad hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

REINGRESO A UN ÁREA TRATADA

No reingrese a las áreas de aplicación hasta después de 12 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD

OLIMPO 5% SG, no es fito-tóxico a la dosis, sistema de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente peligroso.