

FICHA TÉCNICA

OMEGA® 40% WP

Número de Registro: PQUA N° 2380 - SENASA

IDENTIDAD

Composición	: Myclobutanil
Concentración	: 400 g/Kg
Formulación	: Polvo mojable (WP)
Grupo Químico	: Triazoles
Clase de Uso	: Fungicida Agrícola
Grupo FRAC	: 3

CARACTERÍSTICAS

OMEGA® 40%WP Es un fungicida perteneciente al grupo de los triazoles.

MODO DE ACCIÓN

OMEGA® 40%WP es un fungicida formulado a base de myclobutanil y que tiene acción sistémica, protectora y curativa. El principio activo es absorbido por las hojas y los tallos, y se transporta a través del xilema hacia áreas de crecimiento nuevo en la planta.

MECANISMO DE ACCIÓN

OMEGA® 40%WP actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol de los hongos.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L		
Espárrago	Roya	Puccinia asparagi	100	14	0.02

P.C: periodo de carencia; LMR: límite máximo de residuos

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda una aplicación de OMEGA® 40% WP por campaña como máximo, considerando 2 campañas al año. Iniciar la aplicación cuando las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de la enfermedad.

COMPATIBILIDAD

OMEGA® 40%WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

REINGRESO A UN ÁREA TRATADA

No reingresar sin protección a un campo aplicado después de 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

FITOTOXICIDAD

OMEGA® 40%WP no ha mostrado ser fito-tóxico cuando se utiliza de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente peligroso.